

Skovflåt eller tæge?



Skovflåter




- Spindler (i familie med edderkoppen)
- 8 ben
- Har ingen vinger
- Suger blod fra pattedyr, fugle og krybdyr

Tæger



- Insekt
- 6 ben
- Har vinger

Find en skovflåt




Flåter kan findes året rundt, men går som regel i dvale om vinteren når temperaturen falder til under 5 grader.

De trives bedst i fugtige omgivelser som skov eller krat, og lever på planter i op til 1 meters højde.



Skovflåten lever 2-5 år



Æg

Flåter kan lægge ca. 2000 æg. Efter 1,5 måned klækkes æggene til larver.



Voksen han

Den voksne han bider ikke og dør efter at have parret sig med hunnen.



Larve

Larven ligner en meget lille flåt men har kun 6 ben. Efter at have spist et blodmåltid starter udviklingen til nymfe.



Voksen hun

Som voksen kan hunnen forøge sin vægt 100 gange under det tredje og sidste blodmåltid.



Nymfe

Nymfer er dem mennesker oftest bliver bidt af. Som nymfe skal flåten have sit andet blodmåltid for at udvikle sig til voksen.



Blodfyldt hun

Hunnen falder af og er nu klar til at lægge æg. Bagefter dør hun.

